

APPROCHE D'UN PATIENT

Cours patrouilleurs A déc. 03

Evaluation de la situation :

Sécurité : site + personnelle
Scène : cinétique, renfort ?
Situation : attitude, position victime

Evaluation primaire : 1'

L' = L'état de conscience: Répond-il ? A-V-P-U

A = Alerte (ouverture spontanée des yeux)
V = Stimulation verbale (ouverture des yeux à l'appel)
P = Pain (stimulation douloureuse)
U = Unconscious (aucune réponse)

Alarme

A = Airways : Voies aériennes

1. **Maintien cervical, continu** si trauma
2. Ouvrir et contrôler la bouche si conscient : << Quelque chose dans la bouche? >>
3. Bascule de la tête en arrière attention pas de bascule si trauma
4. Sub-luxation de la mâchoire

B = Breathing: Respire-t-il?

1. Ecouter
 2. Voir
 3. Sentir
 4. si doute 2 insufflations efficaces (max. 5)
- 10 sec. Qualité et fréquence
Si conscient : << Inspiration profonde? Douleur? >>
- Heimlich 5 tapes dorsales
5 compressions abdominales ou
5 comp. thoraciques (femme enceinte, enfant, obèse)
- Ventilation assistée si fréq. Resp. <8 ou >30
- O₂, 8 à 10 l/min
- 5x puis **C**

C = Circulation: Son pouls est-il perceptible?

1. Pouls radial. si absent : Pouls carotidien 5"/côté. Fréquence et qualité
 2. Hémorragie importante et visible ?
- Hémostase provisoire
- Position anti-choc si nécessaire
- RCP

D = Disability : Déficit neurologique ?

1. Pupilles : taille, symétrie, réactivité
2. Motricité et sensibilité des 4 membres

E = Evènement

1. Protection contre le froid

Evaluation secondaire : tête aux pieds 2'

Tête	Déformation, plaies, écoulement de liquide	
Cou	Turgescence jugulaire, déviation trachée, crépitation	Minerve
Dos	Douleur, déformation	
Thorax	Asymétrie, déformation	
Bras	Vascularisation, sensibilité, motricité, déformation	
Abdomen	Volume, dureté	
Bassin	Instabilité	
Jambes	Sensibilité, motricité, déformation, vascularisation ?	